Table T12. Planktonic foraminifer range chart, Hole C0001E. (See table notes.)

Epoch	Zone	Core, section, interval (cm)	Depth CSF (m)	Abundance	Preservation	*Globigerina bulloides*	*Globigerina falconensis*	*Globigerinella siphonifera*	*Globigerinita glutinata*	*Globigerinoides conglobatus*	*Globigerinoides ruber*	*Globigerinoides ruber rosa*	*Globigerinoides sacculifer*	*Globoconella inflata* modern form	*Globoconella inflata* transitional form	*Globoconella puncticulata*	*Globorotalia scitula*	*Globorotalia tumida*	*Globoturborotalita obliquus*	*Hirsutella hirsuta*	*Menardella menardii*	*Neogloboquadrina dutertrei*	*Neogloboquadrina humerosa*	*Neogloboquadrina incompta*	*Neogloboquadrina kagaensis*	*Neogloboquadrina pachyderma* dextral form	*Neogloboquadrina pachyderma* sinistral form	*Orbulina universa*	*Pulleniatina finalis*	*Pulleniatina* spp. dextral form	*Pulleniatina* spp. sinistral form	*Sphaeroidinella dehiscens*	*Truncorotalia crassaformis*	*Truncorotalia crassaformis hessi*	*Truncorotalia crassaformis viola*	*Truncorotalia tosaensis*	*Truncorotalia truncatulinoides*	*Turborotalita quinqueloba*
		315-C0001E-																																				
		1H-1, 7–9	0.07	A	M	C		+	R	+	R		+	C	C		+	+			+	R		A				+	+	R			+				+	+
		1H-2, 36–40	0.47	A	G	R	+		R		+		+	R	C		+	+			+	R		A				+	+	+			+				+	+
		1H-3, 81–83	2.27	A	G	A	+	+	C	+	C	+	+	C	R		+	+			+	C		C				+	+	C			+				+	
		1H-5, 39–43	3.26	A	G	C	+	+	R	+	R	+	+	+	R		+	+			+	+		A			+	+	+	+			+				+	
		1H-CC, 20–25	4.11	A	G	A			+	+	C	+	+	A	+			+			+	C		A				+	+	A			+				+	
		2H-2, 12–16	5.64	A	G	C	+	+	R	+	C	+	+	+	+		+	+			+	R		A			+	+	+	+			+				+	
		2H-3, 12–16	7.04	A	G	+	R	+	R	+	R	R	+	A	C		+	+		+	+	C		+				+	+	R		+	+	+			R	+
		2H-5, 14–18	8.68	A	G	+	+		R	+	+	+	+	A	C		+	+			+	C		A				+	+	C			+	+				
		2H-6, 17–21	10.12	A	G	C	R	+	C	+	R		+	R	+		+	+			+	+		A		+		+	+	R			+					+
Pleistocene	N22	2H-CC, 46–51	13.60	A	G	+		+	+	+	R		+	A							+	A		A				+	+	C			+				+	
		3H-CC, 23–28	14.28	A	G	+		+	+	+	+		+	+	+		+	+				+		A				+	+	+			+			+		+
		4H-CC, 23.5–28.5	32.59	A	G	C	+	R	+		R		+	A	R		+	+	+		+	R		A			+	+		+			+			+		+
		5H-CC, 42–47	42.10	C	G	R	A	+	+	+	C		+	A	R		+	+				+		R				+		+			+	+		+		
		6H-CC, 32.5–37.5	51.60	A	G	+	R	+	+	+	+		+	C	+	+	+	+			+	+		A				+					+	+	+	+		+
		7H-CC, 29.5–34.5	61.07	A	G	R			+		+		+	C	A	R		+			+	+		A				+		R		+	R			+	+	
		8H-CC, 45.5–50.5	70.60	A	G	+	+	+		+	+		+	C	A	+		+			+	+		A				+	+	R		+	+					
		9H-CC, 29–34	80.10	A	M	R	+	+	C		+		+	A	C	+		+				+		A				+	+	+		+	+			+		
		10H-CC, 23.5–28.5	89.60	A	G	+	+	+	+		R		+	A	A	+	+	+			+	R		C				+	+	+			+			+		
		11H-CC, 26.5–31.5	99.10	C	M	R	+		C	+	+		+	A	A	+		+					+	+		+		+		+			+			+	+	
		12H-CC, 21–26	108.60	A	G	C	+		+	+	R		+	C	A	+	+	+	+		+	+	+	A	+		+	+			+	+	+			+	+	+
		13H-CC, 25–30	118.10	A	G	R	R		+	+	C		+	C	R	+		+	+			+	R	A	+		+	+		+		+	+			+	+	R

Notes: CSF = core depth below seafloor. Abundance: A = abundant, C = common, R = rare, + = present. Preservation: G = good, M = medium.