Table T14. Planktonic foraminifer range chart, Hole C0001H. (See table notes.)

Epoch	Planktonic foraminifer zone	Core, section, interval (cm)	Depth CSF (m)	Abundance	Preservation	*Candeina nitida*	*Dentoglobigerina altispira*	*Globigerina bulloides*	*Globigerina falconensis*	*Globigerinella obesa*	*Globigerinella siphonifera*	*Globigerinita glutinata*	*Globigerinoides conglobatus*	*Globigerinoides ruber*	*Globigerinoides sacculifer*	*Globoconella conoidea*	*Globoconella conomiozea*	*Globoconella sphericomiozea*	*Globoquadrina baroemoenensis*	*Globorotalia plesiotumida*	*Globorotalia scitula*	*Globorotalia tumida*	*Globorotalia* cf. *tumida*	*Globoturborotalita decoraperta*	*Globoturborotalita extremus*	*Globoturborotalita nepenthes*	*Globoturborotalita obliquus*	*Hirsutella margaritae*	*Menardella menardii*	*Menardella pseudomiocenica*	*Neogloboquadrina acostaensis* dextral form	*Neogloboquadrina acostaensis* sinistral form	*Neogloboquadrina* cf. *asanoi*	*Neogloboquadrina conglomerata*	*Neogloboquadrina humerosa*	*Neogloboquadrina pachyderma* dextral form	*Neogloboquadrina pachyderma* sinistral form	*Neogloboquadrina praehumerosa*	*Orbulina universa*	*Pulleniatina primalis* sinistral form	*Sphaeroidinellopsis seminulina*	*Sphaeroidinellopsis subdehiscens*	*Turborotalita quinqueloba*
		315-C0001H-																																										
		1R-CC, 26–31	234.24	C	G			R	+		+	C			+				+					R			R		C	+					R	A	R	+	+	+	+	
		2R-CC, 0–5	246.34	C	G			+	R		+	C	+	+	+		+	+			+	+				+	+		+				+		C	A	R	+	+	+	+	+
		3R-CC, 0–5	254.41	R	M			+	+			+			+									+	+	+	+		+							+	+	+		+		
		4R-CC, 21–26	265.54	R	M		+	+	+						+	+	+				+		+	+	+		+		+							+	+	+			+	
		5R-CC, 0–5	272.00	R	M		+	+	+							+											+		+						+							
		6R-CC, 35–40	280.32	R	P									+													+													+	+	
		7R-CC, 35–40	296.46	R	M		+	+	+	+		+			+	+	+									+	+		+	+				+	+	+	+	+	+		+	
		8R-CC, 16–21	305.69	R	M			+				+			+												+								+	+	+				+	
		9R-CC, 0–5	304.30	R	P				+			+				+												+							+	+	+			+		
early Pliocene	N18	10R-CC, 26.5–31.5	319.95	R	M		+	+	+			+			+	+	+							+	+	+	+		+							+	+			+		
		11R-CC, 0–5	329.42	R	M			+	+			+			+	+										+	+		+						+			+		+		
		12R-CC, 0–5	338.52	R	M			+	+	+		+			+	+											+		+		+	+				+	+				+	
		13R-CC, 0–5	349.06	R	M		+	+	+			+			+	+	+			+						+	+		+				+							+		
		14R-CC, 23–28	357.21	R	M			+	+			+			+	+					+							+							+	+		+	+			
		15R-CC, 22–27	365.07	R	M		+	C	R			C		+	R	C	+							+	+	R	A		+						+	+	+	+	+			
		16R-CC, 17.5–22.5	375.10	R	P		+					+			+	+	+			+							+		+					+		+		+		+	+	
		17R-CC, 0–5	380.83	R	P		+	+	+			A			C	+			+	+		+		+			C	R	+						+							
		18R-CC, 0–5	391.74	C	M	+	+	R	R	+		A		+	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+	C	+	+	+					+	A	R	+	+	+	+	+	+
		19R-CC, 0–5	400.89	R	M		+	+	+			+			+	+	+				+				+	+	+		+					+	+	+		+	+	+	+	
		20R-CC, 0–5	407.50	R	P			+	+			+			+	+								+		+	+		+						+	+				+		
		21R-CC, 0–5	417.85	R	M		+	+		+	+	+		+	+	+	+				+	+	+	+		+	+	+	+							+		+		+		
		22R-CC, 0–5	422.71	R	P		+	+	+			+		+	+	+					+					+	+		+						+	+	+	+		+		
? late Miocene	N17b	23R-CC, 29–34	431.56	R	M			+				+			+												+		+						+	+			+	+		
		24R-CC, 0–5	441.84	R	M		+	+	+		+				+											+	+		+		+				+	+	+	+	+		+	
		25R-CC, 30.5–35.5	449.53	R	P			+	+			+			+												+								+					+	+	
		26R-CC, 15–20	456.55	R	M		+	+	+			+			+												+		+		+				+		+	+	+	+	+	

Notes: CSF = core depth below seafloor. Abundance: A = abundant, C = common, R = rare, + = present. Preservation: G = good, M = medium, P = poor.