Expedition 317 Site U1351, Table T12. Benthic foraminifer abundance, preservation, and distribution, Site U1351. (See table notes.)

| Core, section | Top depth CSF-A (m) | Abundance | Preservation | *Anomalinoides parvumbilianus* | *Anomalinoides sphericus* | *Astorononion* spp. | *Bolivina* spp. | *Bolivinita pliozea* | *Bolivinita* cf. *pliozea* | *Bulimina aculeata* | *Bulimina marginata* | *Cassidulina carinata* | *Cassidulina* spp. | *Cibicides deliquatus* | *Cibicides molestus* | *Cibicidoides neoperforatus* | *Cibicidoides* spp. | *Eherenbergina mestateri* | *Elphidium charlottense* | *Elphidium novozealandicum* | *Gavelinopsis* spp. | *Globocassidulina subglobosa* | *Haeuslerella finlayi* | *Haeuslerella morgani* | *Haeuslerella parri* | *Haynesina depressa* | *Hoeglundina elegans* | *Hopkinsina mioindex* | *Lenticulina calcar* | *Melonis affinis* | *Melonis pompilioides* | *Nonionella flemingi* | *Nonionella* spp. | *Nonionella turgida* | *Notorotalia aucklandica* | *Notorotalia briggsi* | *Notorotalia clathrata (hornibrooki)* | *Notorotalia depressa* | *Notorotalia finlayi* | *Notorotalia hurupiensis* | *Notorotalia inornata* | *Notorotalia profunda* | *Notorotalia* sp. A (large plano-convex) | *Notorotalia taranakia* | *Notorotalia zelandica* | *Paracassidulina neocarinata* | *Pullenia bulloides* | *Pullenia* spp. | *Pyrgo anomala* | *Pyrgo guerreri* | *Pyrgo* spp. | *Quinqueloculina auberiana* | *Quinqueloculina seminula* | *Rectobolivina parvula* | *Sigmoilopsis schlumbergeri* | *Sphaeroidina bulloides* | *Textularia miozea* | *Texturalia* spp. | *Trifarina* spp. | *Uvigerina miozea* | *Uvigerina peregrina* | *Uvigerina rodleyi* | Others | Comments |
|---|---|---