Table T7. Preservation and relative abundance of radiolarians, Hole U1335B. (See table notes.)

| Core, section, interval (cm) | Radiolarian zone | Abundance | Preservation | Mixing | *Acrobotrys tritubus* | *Acrocubus octopylus* | *Amphirhopalum ypsilon* | *Anthocyrtidium angulare* | *Anthocyrtidium jenghisi* | *Artophormis gracilis* | *Botryostrobus miralestensis* | *Calocycletta caepa* | *Calocycletta costata* | *Calocycletta robusta* | *Calocycletta serrata* | *Calocycletta virginis* | *Carpocanopsis bramlettei* | *Carpocanopsis cingulata* | *Carpocanopsis cristata* | *Cycladophora davisiana* | *Cyrtocapsella cornuta* | *Cyrtocapsella japonica* | *Cyrtocapsella tetrapera* | *Diartus hughesi* | *Diartus petterssoni* | *Didymocyrtis antepenultima* | *Didymocyrtis avita* | *Didymocyrtis bassanii* | *Didymocyrtis laticonus* | *Didymocyrtis mammifera* | *Didymocyrtis penultima* | *Didymocyrtis prismatica* | *Didymocyrtis tetrathalamus* | *Didymocyrtis tubaria* | *Didymocyrtis violina* | *Dorcadospyris alata* | *Dorcadospyris ateuchus* | *Dorcadospyris cydacantha* | *Dorcadospyris dentata* | *Dorcadospyris forcipata* | *Dorcadospyris papilio* | *Dorcadospyris praeforcipata* | *Dorcadospyris riedeli* | *Dorcadospyris scambos* | *Dorcadospyris simplex s.s.* | *Eucyrtidium diaphanes* | *Eucyrtidium mitodes* | *Lamprocyrtis neoheteroporos* | *Lamprocyrtis nigriniae* | *Liriospyris longicornuta* | *Liriospyris parkerae* | *Liriospyris stauropora* | *Lithopera neotera* | *Lithopera renzae* | *Lophocyrtis leptetrum* | *Lophocyrtis pegetrum* | *Lychnocanoma apodora* | *Lychnocanoma elongata* | *Lychnodictyum audax* | *Phormostichoartus doliolum* | *Phormostichoartus fistula* | *Pterocanium prismatium* | *Solenosphaera omnitubus* | *Spongaster berminghami* | *Spongaster pentas* | *Spongaster tetras* | *Stichocorys armata* | *Stichocorys delmontensis* | *Stichocorys johnsoni* | *Stichocorys peregrina* | *Stichocorys wolffii* | *Stylatractus universus* | *Theocorythium trachelium* | *Theocyrtis annosa* |
|---|---|---